

MEYVALARDA İLAÇLAMA PROGRAMI		
İLAÇLAMA ZAMANI	HASTALIK VEYA ZARARLI ADI	İLACIN ETKİLİ MADDESİ
KIŞ İLAÇLAMASI İlk ilaçlama; yaprakların %70'i döküldüğünde %2-4'lük, İkinci ilaçlama; budamadan sonra %1-2'lik	<u>Yumuşak ve Sert Çekirdeklielerde:</u> Her Türlü Mantari Hastalıklar	Bordo Bulamacı; Göz taşı-Kireç karışımı veya hazır Bordo Bulamacı
GÖZLER UYANMADAN ÖNCE	Kabuklu Bit, Unlu Bit	Kışlık Yağ Uygulaması yapılır.
ÇİÇEK ÖNCESİ	<u>Sert Çekirdeklielerde:</u> Çiçek Monilyası, Yaprak delen ve Genel Zararlılar <u>Yumuşak Çekirdeklielerde:</u> Karaleke, Külleme ve Genel Zararlılar	<u>Sert Çekirdeklielerde:</u> Benomyl, Captan, Thiram <u>Yumuşak Çekirdeklielerde:</u> Benomyl, Captan, Maneb, Mancozeb <u>Zararlılar için:</u> Alphacypermethrin, Deltamethrin, Diazinon, Fenthion
ÇİÇEKLENME BAŞLANGICINDA ve TAM ÇİÇEKLENMEDE olmak üzere iki defa Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında	Çiçek Monilyası	Benomyl, Captan, Thiram
ÇİÇEK SONRASI VE MEYVE OLUŞUMU DÖNEMLERİNDE (Çiçek sonrası dönemden hasada kadar olmak üzere belirli aralıklarla ilaçlamalara devam edilir. Bu ilaçlama zamanları hava şartlarına, kullanılan ilaçların etki süresine ve hastalık-zararlı yoğunluğuna göre ayarlanır.)	<u>Sert Çekirdeklielerde:</u> Monilya, Yaprak delen ve Genel Zararlılar (Meyve iç Kurdu, Yaprak bitleri) <u>Yumuşak Çekirdeklielerde:</u> Karaleke, Külleme ve Genel Zararlılar (İç Kurdu, Yaprak biti)	<u>Sert Çekirdeklielerde:</u> Benomyl, Captan, Thiram <u>Yumuşak Çekirdeklielerde:</u> Benomyl, Captan, Maneb, Mancozeb <u>Zararlılar için:</u> Alphacypermethrin, Deltamethrin, Diazinon, Fenthion