

TCH 206



Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki yarı multi (boğumda 1-2 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 12-14 cm'dir. Kış soğuklarında bile performansını kaybetmez. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 to 2 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 12-14 cm in length and are dark green, having slight grooves. In the cold winter period, the plant does not stop and continues to produce fruit. It is recommended to be planted in early spring, autumn, late autumn.

TCH 27-84-1

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki tekli olup, boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 15-17 cm'dir. Soğuk kış döneminde bitki durmaz ve meyve dökümüne devam eder Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is single with medium internodes. The fruits are averagely 15-17 cm in length and are dark green, having less grooves. In the cold winter period, the plant does not stop and continues to produce fruit.. It is recommended to be planted in early spring, autumn, late autumn.



TCH 158



Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki tekli olup, boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve yeşil, az oluklu, ortalama meyve uzunluğu 16-18 cm'dir. Homojen ve ucu yuvarlak biten düzgün meyvelere sahiptir. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is single with medium internodes. The fruits are averagely 16-18 cm in length with green, having less groove and homogeneous, shapely and round edges. It is recommended to be planted in early spring, autumn, late autumn.

TCH 211



Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki yarı multi (boğumda 1-2 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 14-16 cm'dir. Soğuk kış döneminde bitki durmaz ve meyve dökümüne devam eder. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 to 2 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 14-16 cm in length and are dark green, having less grooves. In the cold winter period, the plant does not stop and continues to produce fruit.. It is recommended to be planted in early spring, autumn, late autumn

TCH 212



Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki yarı multi (boğumda 1-2 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 17-19 cm'dir. Sıcaktan soğuğa, soğuktan sığağa geçiş performansı yüksektir Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar'dır.

It is Beit Alpha type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 to 2 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 17-19 cm in length and are dark green, having less grooves. The transition performance from warm to cold and cold to warm is high. It is recommended to be planted in early spring, autumn, late autumn.

TCH 27-71



Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki yarı multi (boğumda 1-2 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 14-16 cm'dir. Soğuk kış döneminde bitki durmaz ve meyve dökümüne devam eder. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 to 2 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 14-16 cm in length and are dark green, having less grooves. In the cold winter period, the plant does not stop and continues to produce fruit.. It is recommended to be planted in early spring, autumn, late autumn.

TCH 257



Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki yarı multi (boğumda 1-2 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 16-18 cm'dir. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, sonbahar ve geç sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 to 2 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 16-18 cm in length and are dark green, having less grooves. In the cold winter period, the plant does not stop and continues to produce fruit.. It is recommended to be planted in early spring, autumn, late autumn

Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki yarı multi (boğumda 2-3 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 13-15 cm'dir. Sıcaktan soğuşa, soğuktan sığa geçiş performansı yüksektir. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, bahar ve sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (2 to 3 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 13-15 cm in length and are dark green, having less grooves. The transition performance from warm to cold and cold to warm is high. It is recommended to be planted in early spring, spring and autumn.

TH 32



TH 85



Beit Alpha (badem) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki multi (boğumda 3-5 meyve) olup, boğum araları mesafesi kısa'dır. Meyve yeşil, az oluklu, ortalama meyve uzunluğu 10-12 cm'dir. Meyve üzerinde beklediği zaman uzama ve şişme yapmaz. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, ilkbahar, sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (snack size) type parthenocarpic cucumber. It is multi (3 to 5 fruit per node) with short internodes. The fruits are averagely 10-12 cm in length and are green, having slight grooves. They do not expand while it is on the plant for along time. It is recommended to be planted in spring and autumn.

TH 100



Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki semi multi (boğumda 2-3 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 12-14 cm'dir. Sıcaktan soğuğa, soğuktan sığağa geçiş performansı yüksektir. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, ilkbahar ve sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (2 to 3 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 12-14 cm in length and are dark green, having less grooves. The transition performance from warm to cold and cold to warm is high. It is recommended to be planted in early spring, spring and autumn.

TH 129

Beit Alpha (badem) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki multi (boğumda 3-5 meyve) olup, boğum araları mesafesi kısa'dır. Meyve hafif koyu yeşil, hafif oluklu, ortalama meyve uzunluğu 11-13 cm'dir. Meyve üzerinde beklediği zaman uzama ve şişme yapmaz. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi ilkbahar ve sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (snack size) type parthenocarpic cucumber. It is multi (3 to 5 fruit per node) with short internodes. The fruits are averagely 11-13 cm in length and are slight dark green, having slight grooves. They do not expand while it is on the plant for along time. It is recommended to be planted in spring and autumn.



TH 179



Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki yarı multi (boğumda 2-3 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve yeşil, az oluklu, ortalama meyve uzunluğu 16-18 cm'dir. Homojen ve ucu yuvarlak biten düzgün meyvelere sahiptir. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi ilkbahar ve sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (2 to 3 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 16-18 cm in length with green, having less groove and homogeneous, shapely and round edges. It is recommended to be planted in spring and autumn.

TH 185



Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki yarı multi (boğumda 1-2 meyve) olup, boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve yeşil, az oluklu, ortalama meyve uzunluğu 15-17 cm'dir. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar ve sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (1 to 2 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 15-17 cm in length with green, having less groove. It is recommended to be planted in early spring and autumn.

TH 208



Beit Alpha (mini) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki yarı multi (boğumda 2-3 meyve), boğum araları mesafesi orta'dır. Meyve yeşil, pürüzsüz, ortalama meyve uzunluğu 16-18 cm'dir. Homojen ve ucu yuvarlak biten düzgün meyvelere sahiptir. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar ve sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (mini) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (2 to 3 fruit per node) with medium internodes. The fruits are averagely 16-18 cm in length with green, smooth and homogeneous, shapely and round edges. It is recommended to be planted in early spring, autumn, late autumn.

TH 241



Beit Alpha (badem) tipinde partenokarpik hıyar'dır. Bitki yarı multi (boğumda 2-3 meyve) olup, boğum araları mesafesi kısa'dır. Meyve yeşil, az oluklu, ortalama meyve uzunluğu 11-13 cm'dir. Meyve üzerinde beklediği zaman uzama ve şişme yapmaz. Tavsiye edilen yetiştirme dönemi erken ilkbahar, ilkbahar, sonbahar'dır.

It is Beit Alpha (snack size) type parthenocarpic cucumber. It is semi multi (2 to 3 fruit per node) with short internodes. The fruits are averagely 11-13 cm in length and are green, having slight grooves. They do not expand while it is on the plant for along time. It is recommended to be planted in spring and autumn.