



GEÇİT KUŞAĞI
TARIMSAL ARAŐTIRMA
ENSTITÜSÜ

TÜRKMEN 09

Tescil Yılı: 2009

Islah Metodu: Seleksiyon

Morfolojik Özellikleri:

-Gelişme Şekli : Dik , Bitki Boyu : 18-27 cm, Çiçek Rengi :Pembe, Tohum Rengi: Kahverengi, Bin Dane Ağırlığı: 4,12 gr, Gelişme Tabiatı : Yazlık

Tarımsal Özellikleri :

Olgunlaşma Gün Sayısı: 120 gün, Harman Olma Kabiliyeti : Kimyon olgunlaştıktan sonra elle hasat edilip iyice kurutulularak biçerdöver ile harmanlanır.

Verim:

Verim düzeyi iklim ve toprak yapısına göre değişmekle birlikte 47-70kg arasında değişmektedir.İç Anadolu Bölgesinde ilkbaharda Tarlaya ilk girilebildiği tarihte ekimi yapılır. Mibzer 2 kg dekara ayarlanabiliyorsa 20 cm sıra arası mesafe ile 2 kg / da tohum atılır, dekara 10-13 kg DAP gübresi ekimle

beraber verilir. Buğday mibzeri ile ekim yapılacaksa 12-13 kg DAP gübresi ile 2 kg Kimyon tohumluğu karıştırılarak ekilir. Ekim derinliği 1-2 cm olmalıdır. Ekimden sonra mutlaka merdane ile toprak sıkıştırılmalıdır.Yabancı otlar için merdane çekildikten sonra çıkış öncesi yabancı ot ilaçlarından birisi ile ilaçlanır.

Kalite Özellikleri:

Uçucu Yağ Oranı : % 3.3

Aldehitler Toplamı : % 51.5

Hastalık ve Zararlıları:

Alternaria hastalığına hassastır. Tohum ilaçlaması yapılmalı ve tohum bağlama döneminde hastalık görülürse ilaçlanmalıdır.

Önerildiği Alanlar:

İç Anadolu Bölgesi