

## GENEL YETİŞTİRİCİLİK BİLGİLERİ

Kayısı ülkemizin Karadeniz yağış kuşağı hariç her bölgesinde yetişebilen bir meyve türüdür. Yaz aylarında nem oranının düşük olması meyvelerin kalitesi için önemlidir. İlkbaharın geç donlarından etkilendiği için ova ve çukur yerler yerine yamaç ve sırtlar tercih edilmelidir. Toprak istekleri ağır ve çok nemli killi toprak olmayan, geçirgen, iyi havalanan, sıcak ve besin maddelerince zengin, inci dokulu, tınlı veya tınlı-kireçli, humuslu topraklarda en iyi şekilde yetişir.

Kayısı bahçesi tesis edilecek arazi ilkbaharda krizma edilerek veya derince birkaç kez alt üst etmek suretiyle işlenir, toprak sonbahara kadar dinlenmeye bırakılır. Bahçe tesisinde kullanılacak fidan ismine doğru, sertifikalı, tercihen 1 yaşında, aşı yeri kapanmış, gözleri iyi, bol saçak köklü, hastalık ve zararlılardan arındırılmış olmalıdır. Açık köklü fidan dikiminde; ilkbaharda gözler uyanmadan önce, sonbaharda ise ağaçların yapraklarının %70'ten fazlasının döküldüğü zaman yapılmalıdır. Dikim yapılmadan önce dikim budaması ve mantari hastalıklara karşı fungusit içerikli suya daldırma işlemi mutlaka yapılmalıdır. Dikimden hemen sonra bol miktarda can suyu verilmelidir.

Hasat, mücadele ve bakım işlerinin kolay olması için ağaç mümkün olduğu kadar alçaktan taçlandırılmalıdır. Yüksek taçlı kayısı ağaçları güneş yanıklığına maruz kalmaktadır. Şiddetli budamalarda ise ağaç zambak çıkarır ve gelişemez. Aşı macunu ile budama işleminden sonra yara yerleri mutlaka kapatılmalıdır. Budama yapılırken tırnak bırakmadan dipten kesim yapılmalıdır. İlkbaharda toprak işleminde mutlaka, muhtemel don tarihlerinden sonra yapılmalıdır. Sulama ise sabahın erken saatlerinde, akşam veya gece yapılmalıdır. Su, sulama işlemi sırasında ağaç gövdesine değmemelidir.

Meyvecilikte devamlı ve kaliteli mahsul alınabilmesi, bahçe bakımlarının tekniğine uygun olarak yapılmasını gerektirir. Bakım işlerinin yapılmaması, sonraki yılın ürününü olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle şartlar ne olursa olsun bahçenin ömrünün uzun, ağacın sağlığı, ürünün bol, kaliteli ve sürekli olması için tüm bakım işlemleri tekniğine uygun olarak tam ve zamanında yapılmalıdır.



### ADRES

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  
Aşağıbağlar Mah. İsmetpaşa Cad. No: 163

44100 Yeşilyurt/MALATYA

**SANTRAL:** 0 (422) 212 20 00

**FAKS:** 0 (422) 212 22 70

**E-POSTA:** kayisi@gthb.gov.tr

### WEB ADRESİ

<http://arastirma.tarim.gov.tr/kayisi>



Kayısı Araştırma Enstitüsü

T.C.  
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYISI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  
MÜDÜRLÜĞÜ



## CASNA DRENOVA

### KAYISI ÇEŞİDİ



MALATYA - 2016

# CASNA DRENOVA

## Orijin Özellikleri

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Orijini             | : Polonya        |
| Tescil Yılı         | : 2010           |
| Islah Yeri - Yılı   | : Malatya – 1988 |
| Islah Yöntemi       | : İntrodüksiyon  |
| Değerlendirme Şekli | : Sofralık       |



**POLONYA MENŞELİ  
SOFRALIK RENKLİ  
KAYISI ÇEŞİDİDİR.**



## Morfolojik Özellikleri

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gelişme Kuvveti | : Kuvvetli |
| Ağaç Habitüsü   | : Yayvan   |

## Fenolojik Özellikleri

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Çiçeklenme Dönemi | : Mart 1. ve 3. hafta arası |
| Soğuklama İsteği  | : 800 saat (ort.)           |
| Hasat Zamanı      | : Temmuz 1. hafta (Orta)    |

## Pomolojik Özellikleri

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Meyve Ağırlığı     | : 30-40 g              |
| Meyve Büyüklüğü    | : Küçük                |
| Meyve Şekli        | : Eğik Eşkenar Dörtgen |
| SÇKM (%)           | : 14-16                |
| Çekirdek Ağırlığı  | : 2.0 g (ort.)         |
| Meyve Eti Sertliği | : Yumuşak              |

## Duyusal Özellikleri

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Çekirdeğe Bağlanma       | : Yok           |
| Meyve Tadı               | : Az Tatlı      |
| Çekirdek İçi Acılığı     | : Yok           |
| Meyve Simetri Durumu     | : Simetrik      |
| Mey. Kabuğu Zemin Rengi  | : Orta Portakal |
| Mey.Üst Rengin Tonu      | : Kırmızı       |
| Mey.Üst Rengin Yoğunluğu | : Koyu          |
| Meyve Et Rengi           | : Koyu Turuncu  |



Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Gen Kaynakları ekolojisine göre elde edilmiş sonuçları içermektedir.

İklimsel verilerde meydana gelen değişimler nedeniyle belirtilen özelliklerde yıllara göre farklılıklar gözlenebilir.

## DİZGİ & TASARIM :

Zir.Yük.Müh.Burak ASLANOY  
Zir.Müh.Remzi KOKARGÜL

